

BOLETÍN INFORMATIVO PARA SOCIOS Y AMIGOS DE IGUALA3

Número 139, 3 de noviembre de 2025

ASOCIACIÓN DE DAÑO CEREBRAL IGUALA3

Dirección postal:
Iglesia 12, 45008 - Toledo

Teléfonos:

Neuropsicología,
Daniel, 613 046 007
Cristina, 604 993 816
Raquel, 624 846 120

Trabajo Social,
David, 644 367 921

Terapia Ocupacional,
Patricia, 626 875 135
M^a Rosa, 613 004 412


Fisioterapia,
Mai, 613 002 082
Ana, 614 479 761
Nieves, 624 825 019
Ángela, 699 764 450
Leticia, 683 500 252

Logopedia,
Sonia, 623 030 726

Correo electrónico y
Web:
iguala3@iguala3.org
www.iguala3.org

¿Qué es la apraxia del habla y cómo afecta?

La apraxia del habla (ADH) es un problema que afecta al cerebro dificultando mover los músculos de la boca para hablar, esto puede hacer que pronunciar palabras y mantener el ritmo al hablar sea complicado.



¿Qué ocurre en el cerebro? La ADH se da cuando hay daño en la parte izquierda del cerebro. Las áreas clave afectadas son:

- **Área de Broca:** Es importante para producir el habla.
- **Ínsula anterior izquierda:** Ayuda a coordinar los movimientos al hablar.
- **Ganglios basales:** Se relacionan con la planificación de los movimientos.

Estas lesiones cerebrales pueden deberse a derrames, golpes en la cabeza, tumores, infecciones o enfermedades como la degeneración corticobasal.

En lo que se refiere a la apraxia del habla tenemos los siguientes tipos:

- **ADH temporal:** Los movimientos al hablar tienen problemas de ritmo, lo que causa errores de pronunciación.
- **ADH espacial:** Hay problemas con la precisión de los movimientos, lo que resulta en sonidos distorsionados.

En los casos más graves ambos tipos de apraxia pueden darse a la vez en una misma persona, haciéndole que no pueda hablar.

Los **síntomas** que experimentan las personas son los siguientes:

- Cometer errores al intentar decir las mismas palabras.
- Dificultad para empezar frases y corregirse a menudo.
- Cambios en el ritmo y la entonación.

La ADH puede venir junto con otros problemas, como la afasia o la disartria, pero tiene síntomas únicos que la caracterizan como hemos visto.

Tratamiento y Pronóstico

El tratamiento se enfoca en ayudar a la persona a comunicarse, adaptándose a sus necesidades. Al principio, se usan métodos alternativos, como tableros de comunicación o aplicaciones, mientras se trabaja para recuperar el habla.

Algunas estrategias que se suelen utilizar son las siguientes:

- **Terapia PROMPT:** Ayuda a mover la boca para hablar.
- **Terapia de entonación melódica:** Usa música para ayudar a hablar.
- **Sistemas de comunicación aumentativa:** Para que personas con dificultades severas puedan expresar sus necesidades.

La recuperación dependerá de varios factores, como el lugar y tamaño del daño, otros problemas presentes y el tiempo que haya pasado. Se destaca que los pacientes jóvenes con lesiones pequeñas suelen mejorar más.

El Papel de la Familia

El apoyo de la familia es fundamental en la rehabilitación. Es importante que los familiares entiendan el trastorno y participen activamente en las terapias, reforzando las habilidades practicadas en casa.

Conclusión

La apraxia del habla es un trastorno que requiere un buen diagnóstico y tratamiento especializado. Con intervención temprana, estrategias adecuadas y apoyo, los pacientes pueden mejorar su forma de comunicarse y, por tanto, su calidad de vida.

SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES

Puedes acceder a todos los vídeos y fichas en este enlace: [TERAPIA EN CASA CON IGUALA3](#)



INSTAGRAM



FACEBOOK



TWITTER



YOUTUBE



Este boletín se ha enviado a 503 direcciones. La Asociación de Familiares, Amigos y Personas con Daño Cerebral de Castilla La Mancha, IGUALA3, te lo ha enviado porque has facilitado tus datos de contacto, pero si no quieres recibir los siguientes boletines, simplemente escríbenos a iguala3@iguala3.org comunicando tu decisión. Gracias



Castilla-La Mancha

